

Pour le courrier aux centres il faudra mentionner :

- 1- Quand une intervention est planifié de contacter :
 - a. benjamin.breuil@inserm.fr
 - b. Benedicte.buffin-meyer@inserm.fr
 - c. Joost-peter.schanstra@inserm.fr
 - d. simon.t@chu-toulouse.fr
- 2- Avec les informations :
 - a. A partir de quand l'échantillon sera disponible.
 - b. L'adresse et la personne à contacter (nom, téléphone) pour récupérer l'échantillon.
 - c. Pour le patient il nous faut :
 - i. L'âge gestationnel au moment du prélèvement.
 - ii. Indiquer le volume de liquide amniotique obtenu par échographie (normal, anamnios, hydramnios).
- 3- Nous nous chargerons d'organiser le transport et revenons vers le centres pour l'organisation.

Pour le recueil

- Recueil dans n'importe quel tube vide (pot pipi, falcon,...), mais NE PAS de tube avec de l'EDTA ou héparine.
- > 1 mL est suffisant.
- Stocker l'échantillon a -20°C jusqu'au transport.
- L'échantillon peut être du liquide amniotique ou de l'urine foetal.
- En cas d'anamnios, récupérer le liquide pour analyse après une amnioinfusion est possible.