

Vaccin	Recommandations vaccinales en cas de syndrome néphrotique	
BCG	Contre-indiqué sous immunosuppresseurs	
Diphtérie Tétanos Poliomyélite Coqueluche HIB	Primo-vaccination selon le calendrier obligatoire	Puis rappels <ul style="list-style-type: none"> • Selon le calendrier obligatoire • Ou si taux non protecteurs pour les SNCD • Peuvent être administrés en rechute
Hépatite B	PV selon le calendrier obligatoire	
Pneumocoque	PV selon le calendrier obligatoire	<ul style="list-style-type: none"> • Dès le diagnostic: vaccination PPSV23 ou rappel PCV13 si besoin • Voir les différents schémas selon l'âge
Méningocoque	PV selon le calendrier obligatoire	
Varicelle		<ul style="list-style-type: none"> • Au diagnostic: sérologie • Si séronégatif: vacciner dès que possible <ul style="list-style-type: none"> • en rémission • Quand prednisone <2 mg/kg/j et < 20 mg/j durant >14 j • >3 mois après les bolus de corticoïdes • et en l'absence de tout IS, au moins 6 mois après l'arrêt pour le Rituximab
Rougeole Oreillons Rubéole		<ul style="list-style-type: none"> • Si non vacciné: mise à jour du calendrier vaccinal selon le même principe que pour la varicelle
Grippe		<ul style="list-style-type: none"> • Tous les ans
Papilloma virus		<ul style="list-style-type: none"> • Filles: dès l'âge de 9 ans • Garçons: à l'adolescence si encore sous IS